



Αυξημένος κατά 610% ο κίνδυνος για μυοκαρδίτιδες!

Από Newsroom pronews.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκε η μεγαλύτερη έρευνα για τις παρενέργειες των εμβολίων mRNA για τον COVID-19 που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Global Vaccine Data Network (GVDN). Περιλαμβάνει ένα τεράστιο δείγμα 99 εκατομμυρίων εμβολιασμένων ατόμων και τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Vaccine.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το εμβόλιο προκαλεί:

1. Κίνδυνο μυοκαρδίτιδας αυξημένο έως και 610% μετά την λήψη εμβολίου mRNA.
2. Αυξημένος κίνδυνος οξείας διάχυτης εγκεφαλομυελίτιδας (ADEM) κατά 378% μετά από εμβόλιο mRNA.
3. Αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης του εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου (CVST) μετά από εμβόλιο mRNA έως και 323%.
4. Αυξημένος κίνδυνος συνδρόμου Guillain-Barré (GBS) έως και 249%.

Την ίδια ώρα ο Albert Bourla, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, σε συνέντευξη που

παραχώρησε στο CNBC για τους στόχους της εταιρείας το 2025, παραδέχεται ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στις ΗΠΑ για τον COVID-19 είναι χαμηλά εξαιτίας της ανησυχίας του κοινού για τις παρενέργειες του εμβολίου.

Ο Bourla έχει μιλήσει για το εμβόλιο mRNA σε διάφορες περιπτώσεις.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι η τεχνολογία mRNA δεν είχε επαρκή αξιοπιστία όταν κυκλοφόρησε το εμβόλιο.

Αυτό υποδηλώνει μια αναγνώριση από την πλευρά του ότι υπήρξαν αβεβαιότητες ή πιθανές παρενέργειες με την έναρξη της χρήσης του εμβολίου και αυτό επιβεβαιώνεται και στην συνέντευξη που έδωσε.

[Πηγή](#)