



Αύξηση 1000% στα επεισόδια νευρολογικών διαταραχών-επιλησιών μετά τους εμβολιασμούς.

Newsroom: info@pronews.gr

Αύξηση των ξαφνικών θανάτων κατά 300% καταγράφεται μετά τα χρόνια της καραντίνας και των αναγκαστικών εμβολιασμών κατά Covid-19.

Οι ξαφνικοί θάνατοι προέρχονται κυρίως από εμφράγματα τα οποία προκαλούνται από μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες των οποίων η εμφάνιση οφείλεται στους υποχρεωτικούς και εκβιαστικούς εμβολιασμούς με πειραματικά επί της ουσίας εμβόλια τα οποία είχαν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Στις παρενέργειες των εμβολίων ήταν και οι επιληπτικές κρίσεις,

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιληπτική κρίση δεν προκαλεί καρδιακή ανακοπή αλλά αποτελεί απειλή για τον παθόντα καθώς χωρίς να το θέλει μπορεί να χτυπήσει άσχημα το κεφάλι του.

Το να πεθάνει ένας επιληπτικός από καρδιοπάθεια είναι σπανιότατο.

Εκτός εάν η καρδιοπάθεια έχει προκληθεί από άλλον παράγοντα όπως είναι ο εμβολιασμός του ατόμου στο παρελθόν με τα σκευάσματα κατά Covid-19.

Όπως και να έχει η αύξηση στα επιληπτικά επεισόδια ήταν κατακόρυφη μετά τους εμβολιασμούς, πολλά εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα όπως αποκαλύπτει σχετικό άρθρο του 2023!

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω αναρτήσεις είναι χαρακτηριστικές.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας είχε προχωρήσει σε απίστευτες αποκαλύψεις για τα εμβόλια για τον κορωνοϊό ο δικηγόρος του Οχάιο Thomas Renz, κατά τη συνάντηση κορυφαίων επιστημόνων στην Ουάσινγκτον.

Ο δικηγόρος του Οχάιο Thomas Renz, ο οποίος εκπροσωπούσε πελάτες που μήνυσαν τις πολιτικές εμβολίων, ισχυρίστηκε ότι τα εμβόλια για τον COVID-19 προκαλούν καταστροφική βλάβη στα μέλη του αμερικανικού Στρατού και έδωσε μάλιστα συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία προκάλεσαν τρόμο!

Ο Renz συνόψισε δεδομένα που ελήφθησαν από την Defense Medical Epidemiology Database (DMED), την μακροχρόνια επιδημιολογική βάση δεδομένων των μελών του στρατού.

Τα στοιχεία δείχνουν, όπως λέει, πως:

Οι αποβολές αυξήθηκαν 300% το 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Ο καρκίνος αυξήθηκε 300% το 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Τα εμφράγματα του μυοκαρδίου αυξήθηκαν κατά 269% το 2021 σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Οι νευρολογικές διαταραχές αυξήθηκαν 1000% το 2021 κατά τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, αυξάνοντας από 82.000 σε 863.000 σε ένα χρόνο.

Όταν λέμε νευρολογικές διαταραχές φυσικά μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται η επιληψία.

Οι καταγγέλλοντες παρείχαν τα δεδομένα γνωρίζοντας ότι θα αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ψευδορκία αν υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο δικαστήριο σε νομικές υποθέσεις που εκκρεμούν κατά του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DOD).

Οι στρατιωτικοί καταγγέλλοντες ανέφεραν ότι μια έρευνα DMED για «οξεία μυοκαρδίτιδα» οδήγησε σε 1.239 περιπτώσεις τον Αύγουστο του 2021, αλλά η ίδια έρευνα τον Ιανουάριο του 2022 είχε ως αποτέλεσμα μόνο 307 περιπτώσεις.

Ο καρδιολόγος Δρ Peter McCollough, σχολιάζοντας την παρουσίαση του Renz, είπε ότι η μυοκαρδίτιδα περιγράφεται ψευδώς ως ήπια και παροδική, όταν στην πραγματικότητα προκαλεί μόνιμη καρδιακή βλάβη και είναι περιοριστική για την ζωή στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σε απλά ελληνικά αυτό για τους Έλληνες πολίτες σημαίνει το εξής:

Ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να έπαθα μυοκαρδίτιδα και να μην το γνωρίζουν καν!

Αυτή αποτελεί πλέον μία μόνιμη βλάβη για την καρδιά και απλώς «περιμένει» τον κατάλληλο χρόνο για να εκδηλωθεί ακόμα και με θανατηφόρες συνέπειες.

Αυτό μπορεί να συμβεί 3,4, 5, 6,... μέχρι και 15 χρόνια μετά τους εμβολιασμούς!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ξαφνικοί θάνατοι συνεχίζονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και χιλιάδες άνθρωποι σε «μάχιμες» ηλικίες «σβήνουν» ξαφνικά ή πεθαίνουν από καρκίνους «turbo» μέσα σε μερικές μέρες!

Γιατί όπως φαίνεται από τα εμβόλια έχουν προκληθεί και άλλες διαταραχές που προκαλούν αυτοάνοσες καταστάσεις.

Να σημειωθεί επίσης ότι νέα μελέτη για το εμβόλιο κατά της Covid-19 εγείρει ανησυχίες, καθώς εντοπίζεται πιθανή σύνδεση με αυξημένο κίνδυνο οφθαλμικών επιπλοκών, οι οποίες – σε ορισμένες περιπτώσεις – ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε μερική ή ολική απώλεια όρασης.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως αν οι αλλαγές στο μάτι διαρκούν χρόνια, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διόγκωση του κερατοειδούς ή θολή όραση!

Η προσοχή των επιστημόνων στράφηκε στον κερατοειδή χιτώνα – το διαφανές, μπροστινό μέρος του ματιού που επιτρέπει την είσοδο του φωτός και είναι απαραίτητο να παραμένει καθαρό και υγιές.

Η μελέτη εξέτασε κατά πόσο το εμβόλιο της Pfizer μπορεί να επηρεάσει τη διαύγεια και τη δομή αυτής της ευαίσθητης περιοχής.

Τα εμβόλια κατά του Covid-19 ευθύνονται για τουλάχιστον 3 εκατ. θανάτους «πάνω από το μέσο όρο» που καταγράφηκαν παγκοσμίως μετά την πανδημία μέχρι τον Αύγουστο του 2024.

Έχει ζητηθεί από τις κυβερνήσεις να διερευνήσουν γιατί πεθαίνουν τόσοι περισσότεροι άνθρωποι από το μέσο όρο, τα χρόνια μετά τα εμβόλια

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ ανέλυσαν τα ποσοστά θανάτων από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και χωρών της Ευρώπης

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αν και ορισμένοι από τους θανάτους μπορούν να αποδοθούν στη μόλυνση από τον Covid-19, πολλοί ήταν το αποτέλεσμα «έμμεσων επιπτώσεων των στρατηγικών υγείας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης και της μόλυνσης από τον ιό», και σε αυτές περιλαμβάνόταν ο μαζικός εμβολιασμός.

Οι παρενέργειες των εμβολίων περιλαμβάνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, μυοκαρδίτιδα, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, πήξη αίματος και αιμορραγία.

Το εμβόλιο της AstraZeneca, αποσύρθηκε από παντού, αλλά όχι πριν σκοτώσει αποδεδειγμένα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Στην Ελλάδα απαγορεύθηκε τον Ιούνιο του 2020, ενώ είχαν γίνει πάνω από 2 εκατ. δόσεις στον πληθυσμό που τον διαβεβαίωναν ότι «θα τους έσωζε».

Τα συμβάντα παγκοσμίως περιελάμβαναν υψηλότερο κίνδυνο φλεγμονής που σχετίζεται με την καρδιά από εμβόλια mRNA που έγιναν από την Pfizer Inc., BioNTech SE και Moderna Inc. και έναν τύπο θρόμβου αίματος στον εγκέφαλο μετά ανοσοποίηση με εμβόλια ιικού φορέα όπως αυτό που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και παρασκευάστηκε από την AstraZeneca Plc.

Τα εμβόλια ιικού φορέα συνδέθηκαν επίσης σε σπάνιες περιπτώσεις με για το σύνδρομο Guillain-Barre, μια νευρολογική διαταραχή στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος στο περιφερικό νευρικό σύστημα.

Η μυοκαρδίτιδα, ή φλεγμονή του καρδιακού μυός, εντοπίστηκε σταθερά μετά από μια πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση εμβολίων mRNA, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η υψηλότερη αύξηση στην αναλογία παρατηρούμενου προς το αναμενόμενο παρατηρήθηκε μετά από δεύτερη δόση με το Moderna.

Η πρώτη και η τέταρτη δόση του ίδιου εμβολίου συνδέθηκαν επίσης με αύξηση κινδύνου της περικαρδίτιδας.

Οι ερευνητές βρήκαν μια στατιστικά σημαντική αύξηση των περιπτώσεων του συνδρόμου Guillain-Barre εντός 42 ημερών από μια αρχική δόση του εμβολίου ChAdOx1 ή «Vaxzevria» που αναπτύχθηκε στην Οξφόρδη – κάτι που δεν παρατηρήθηκε με εμβόλια mRNA.

Με βάση το ιστορικό επίπτωσης της πάθησης, αναμένονταν 66 περιπτώσεις — αλλά παρατηρήθηκαν 190 συμβάντα.

Το ChAdOx1 συνδέθηκε με τριπλάσια αύξηση της θρόμβωσης του εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου, ενός τύπου θρόμβου αίματος στον εγκέφαλο, που εντοπίστηκε σε 69 συμβάντα, ενώ θα ανέμενε κανείς μόνο 21.

Ο μικρός κίνδυνος οδήγησε στην απόσυρση ή τον περιορισμό του εμβολίου στη Δανία και σε πολλές άλλες χώρες.

Η μυοκαρδίτιδα συνδέθηκε επίσης με μια τρίτη δόση ChAdOx1 σε ορισμένους, αλλά όχι όλους, πληθυσμούς που μελετήθηκαν.

Παρατηρήθηκαν χιλιάδες περιπτώσεις οξείας διάχυτης εγκεφαλομυελίτιδας μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος επιλέχθηκαν με βάση προκαθορισμένες συσχετίσεις με την ανοσοποίηση, όσα ήταν ήδη γνωστά για τις

παθήσεις που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό και την προκλινική έρευνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν παρακολούθησε το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας ή POTS, που ορισμένες άλλες έρευνες έχουν συνδέσει με τα εμβόλια Covid.

Η δυσανεξία στην άσκηση, η υπερβολική κόπωση, το μούδιασμα και η «ομίχλη του εγκεφάλου» ήταν μεταξύ των κοινών συμπτωμάτων που εντοπίστηκαν σε περισσότερους από 240 ενήλικες που εμφάνισαν χρόνια μεταεμβολιαστικό σύνδρομο σε μια ξεχωριστή μελέτη που διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του Γέιλ.

Τα σκευάσματα, που παρουσιάστηκαν ως «εμβόλια» κατά του ιού Covid-19 που δημιουργήθηκε στο κινεζικό εργαστήριο της Γιουχάν με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Μπάιντεν, έχουν προκαλέσει μέσα σε πέντε χρόνια, περισσότερους θανάτους λόγω παρενεργειών από ότι τα εμβόλια των περασμένων 33 ετών, όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός αμερικανικός οργανισμός VAERS (Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων) που ανήκει στο CDC (το κεντρικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ).

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως οι παρενέργειες των εμβολίων θα ακολουθούν τους εμβολιασμένους μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει μετά από κάποια χρόνια...

[Πηγή](#)